



کتاب آنلاین®

مرجع تخصصی عرضه آنلاین کتاب

مشاهده

چند صفحه

اول کتاب

بالآخره تمام شد! بعد از دو سال زحمت، آخرین کلمه از تألیف این کتاب رو در آخرای یه شب تابستانی گرم نوشتم و حس عجیبی رو تجربه کردم! از طرفی خوشحال بودم از این که موفق شدم کاری رو به اتمام برسونم و از طرف دیگه سخت دلتنگش بودم و یه حس غریبی از این که دیگه با این کتاب برای مدتی کاری ندارم، وجودم رو فرا گرفت. به همین خاطر صاف رفتم سمت تلفن همراهم و دیدم چیزی به جز صدای استاد محمدرضا شجریان نمی‌تونه مناسب حال و هوام باشه ... هندزفری رو گذاشتم و آواز مورد علاقه‌ام رو پلی کردم ...



«مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم آه اگر خرقة پشمن به گرو نستانند...»

بعد هم‌زمان رفتم به سراغ دیدن فصل‌های مختلف کتاب و همین‌طور شروع کردم به ورق‌زدن و خواندن درس‌نامه‌ها، تست‌ها، پاسخ‌ها و از خودم سؤال می‌کردم که: شد اون چیزی که می‌خواستی؟ و ارزشش رو داشت دو سال تلاش؟

فکر کردم به تمام دو سالی که شبانه‌روز رفتیم و اومدیم، نشستیم و نوشتیم، دیدیم نشد، پاک کردیم و دوباره نوشتیم، بحث کردیم و دعوا مان شد، ولی از کیفیتی که می‌خواستیم کوتاه نیامدیم و ... ته دلم حس کردم راضی‌ام و ارزشش رو داشت پس با خیال راحت آخرین فایل کتاب رو ارسال کردم و منم با صدا تکرار کردم ...

... ما همه بنده و این قوم خداوندانند ...

اما چند خطی هم درباره کتاب

چند سالی بود که از چاپ آخرین ویرایش کتاب ریاضی نهم تیزهوشان می‌گذشت و با توجه به ساختار جدید آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس برتر و سمت و سوی جدیدی که سؤالات این آزمون‌ها داشتند، تصمیم گرفتیم که این کتاب رو به طور کلی و از صفر تا صد بازنویسی کنیم. باشد که مقبول افتد!

۱. **درس‌نامه‌ها:** چالشی‌ترین قسمت کارمان مربوط به درس‌نامه‌های این کتاب بود، اولاً تلاش کردیم درس‌نامه‌ها روان، آموزشی و به قول خودمانی، به درد بخور باشد و برایمان مهم بود که با خواندن آن بشود از پس تست‌ها برآمد. علاوه بر این‌ها در کنار تدریس معلمان محترم که هیچ چیز جای آن را نخواهد گرفت، منبعی برای دوره و حل سؤالات آموزشی باشد، پس به همین خاطر حداکثر وسواس را درباره آن به خرج دادیم تا بشود نسخه فعلی.

۲. **تست‌ها:** سعی کردیم سؤالات به‌روز باشند و در کنار تست‌های تألیفی از سؤالات آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان، مدارس برتر، مدارس نمونه دولتی و ... استفاده کردیم و خیلی برایمان مهم بود

سراغ تست‌های به اصطلاح نظام قدیم! کنکورها و آنچه مربوط به پایه‌های بالاتر بود، نرویم زیرا با همفکری که با اساتید محترم این حوزه داشتیم به اتفاق بر این باور بودیم که حل سؤالات خارج از چارچوب چیزی جز اتلاف وقت و ایجاد حس ناامیدی برای دانش‌آموزان نخواهد داشت. هم‌چنین موضوع دیگر در تست‌ها، چینش مناسب و دسته‌بندی آن‌ها بود به طوری که آمدن تست‌ها به شکلی باشد که واقعا در طی آن روال آموزش به درستی جلو برود و همین‌که تقدم مباحث به صورت درست و حتی المقدور با پیشروی کتاب درسی باشد، بنابراین حداقل تست‌های این کتاب بیش از ده مرحله توسط خودمان و کارشناسان محترم بازبینی شده تا به شما برسد.

در کنار هر تست یک علامت (😊) آورده شده است تا در زمانی که مشغول حل کردن تست‌ها هستید با توجه به سطح سؤال، آن را به یکی از شکل‌های (😊) یا (😐) یا (😞) تبدیل کنید! این کار باعث می‌شود در زمانی که تصمیم به دوره گرفتید بتوانید به راحتی و با توجه به شکلک‌ها، سؤالات مهم‌تر خودتان را حل کنید! البته در کنار بعضی از سؤالات هم علامت (🔥) آورده شده است. این سؤالات عموماً سؤالات سخت‌تری هستند که خودمان برایتان سطح‌بندی کردیم تا در مواجهه با آن‌ها جا نخورید! علاوه بر این‌ها، شماره و (😊) کنار بعضی از تست‌ها رنگی شده، این تست‌ها برای دوره مباحث یا وقتی که زمان برای پاسخگویی به همه سؤالات را ندارید انتخاب شده‌اند و لزوماً تست‌های مهم‌تری به حساب نمی‌آیند بلکه برای این‌که ایده‌های اصلی را دیده باشید مناسب هستند.

۳. **پاسخ‌نامه تشریحی:** پاسخ‌نامه‌های واقعاً تشریحی برایتان نوشتیم و هیچ چیزی را ناگفته رها نکردیم. تمام مراحل حل سؤال را با حوصله و سر صبر برایتان آوردیم و هیچ چیز را بدیهی فرض نکردیم. خلاصه که در پاسخ‌نامه کتاب سنگ تموم گذاشتیم چون که عمیقاً معتقدیم پاسخ‌نامه باید آن‌قدر جامع و تمیز باشد که دانش‌آموز پس از مراجعه به آن هیچ چیز نامفهومی از سؤال برایش باقی نمانده باشد.

تشکرها:

بدون شک این کتاب به چاپ نمی‌رسید مگر با همکاری تیم بزرگی که از ما حمایت کردند به همین خاطر تشکر می‌کنیم از:

دکتر امید نصری و دکتر کمیل نصری مدیران محترم انتشارات خیلی‌سبز که به ما اعتماد کردند و تألیف این کتاب را به ما سپردند.

دکتر کورش اسلامی که فصل به فصل به ما مشورت دادند و پدرانه در کنار ما ایستادند.

خانم سمیه خادمان که تلاش‌ها و پیگیری و نظم ایشان کتاب را به چاپ رساند.

دوستان خوبمان آقایان سهیل سمایی و فرشید اعرابی و تیم محترمشان که در تولید پی‌دی‌اف کتاب از هیچ چیزی کم نگذاشتند.

حرف آخر!

قلباً معتقدیم که کتاب فعلی خالی از اشکال و ایراد نیست به همین خاطر از اساتید گرامی و خوانندگان کتاب دعوت می‌کنیم که با ارسال ایرادات و نظرات به @mohamadiri.az به بهبود سطح کیفیت کتاب و رفع ایرادات احتمالی کمک کنند.

با آرزوی سلامتی و موفقیت

برای تمامی معلمان و دانش‌آموزان ایران

فهرست

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

درسنامه

فصل اول

۲۵ ۶ مجموعه‌ها

فصل دوم

۷۵ ۵۷ عددهای حقیقی

فصل سوم

۱۳۰ ۹۹ استدلال و اثبات در هندسه

فصل چهارم

۱۸۸ ۱۶۴ توان و ریشه

فصل پنجم

۲۴۴ ۲۱۵ عبارت‌های جبری

فصل ششم

۲۹۶ ۲۷۰ خط و معادله‌های خطی

فصل هفتم

۳۳۵ ۳۲۳ عبارت‌های گویا

فصل هشتم

۳۷۷ ۳۴۸ حجم و مساحت

۴۰۳ پاسخ‌نامه کلیدی

فصل چهارم

توان وریشه

توان

از سال هفتم با توان آشنایی دارید و می‌دانید که عددی مثل $۲^۳$ را به صورت ۲ به توان ۳ می‌خوانیم و معادل $۲ \times ۲ \times ۲$ یعنی ۸ است.

$$\left(\frac{۲}{۵}\right)^۳ = \frac{۲}{۵} \times \frac{۲}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۸}{۱۲۵}$$

مثلاً

در ادامه مهم‌ترین نکات توان را با هم دوره می‌کنیم.

نکات

$$۱۰۰^۱ = ۱۰۰, (-۱۰)^۱ = -۱۰$$

۱ هر عدد به توان یک برابر خود عدد است.

$$۵^۰ = ۱, (-۷)^۰ = ۱$$

۲ حاصل هر عدد به جز صفر به توان صفر برابر با یک است.

۳ اعداد منفی اگر به توان عددی زوج برسند، حاصل مثبت و اگر به توان عددی فرد برسند، حاصل منفی است.

$$(-۳)^۲ = (-۳) \times (-۳) = +۹$$

$$(-۳)^۳ = (-۳) \times (-۳) \times (-۳) = -۲۷$$

۴ اگر توان زوج باشد، آمدن یا نیامدن پرانتز مهم است.

$$\left. \begin{aligned} -۳^۲ &= -(۳ \times ۳) = -۹ \\ (-۳)^۲ &= (-۳) \times (-۳) = ۹ \end{aligned} \right\} \Rightarrow -۳^۲ \neq (-۳)^۲$$

مثلاً حاصل $-۳^۲$ و $(-۳)^۲$ با هم متفاوت است.

۵ در محاسبه حاصل عبارت‌هایی که دارای عدد توان‌دار هستند با رعایت تقدم عملیات حاصل عبارت را به دست می‌آوریم.

تست

حاصل عبارت $\frac{[۲ \times (۲/۵ - ۰/۷۵)]^۳}{(۰/۷۵ + ۲/۴)^۲} \times (۱۰۰)^۰$ برابر است با:

۱ (۴)

۲ (۱/۷۵)

۳ (۳/۵)

۴ (۷)

با رعایت تقدم عملیات ریاضی داریم:

پاسخ

$$\frac{[۲ \times (2/5 - 0/75)]^3}{(0/75 + 2/4)^2} \times (100)^0 = \frac{(3/5)^3}{(3/5)^2} = 3/5$$

نکته

در جدول زیر توان‌هایی از چند عدد که با آن‌ها زیاد سروکار داریم را آورده‌ایم. البته که توصیه به حفظ آن‌ها نمی‌کنیم ولی دیدن آن‌ها را از دست ندهید.

توان \ پایه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲	۲	۴	۸	۱۶	۳۲	۶۴	۱۲۸	۲۵۶	۵۱۲	۱۰۲۴
۳	۳	۹	۲۷	۸۱	۲۴۳	۷۲۹	۲۱۸۷			
۵	۵	۲۵	۱۲۵	۶۲۵	۳۱۲۵					
۷	۷	۴۹	۳۴۳	۲۴۰۱						



توان منفی

به طور کلی اگر a یک عدد غیرصفر باشد و n یک عدد طبیعی باشد، آن گاه:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

در توان منفی عملاً با معکوس کردن پایه، توان مثبت می شود. تمام فرم هایی با توان منفی که ممکن است با آن ها مواجه شوید، در جدول مقابل آمده است.

مثال	معادل	فرم کلی
$7^{-3} = \frac{1}{7^3}$	$\frac{1}{a^n}$	a^{-n}
$\frac{1}{(\frac{4}{5})^{-7}} = (\frac{4}{5})^7$	a^n	$\frac{1}{a^{-n}}$
$(\frac{3}{4})^{-2} = (\frac{4}{3})^2$	$(\frac{b}{a})^n$	$(\frac{a}{b})^{-n}$
$\frac{5^{-4}}{3^{-7}} = \frac{3^7}{5^4}$	$\frac{b^n}{a^m}$	$\frac{a^{-m}}{b^{-n}}$

تست

حاصل $[(5^{-1} + 3^{-1})^{-1} \div (3^{-2} - 4^{-1})]^{-1}$ برابر است با:

$$\frac{2}{27} \quad (4)$$

$$\frac{-2}{27} \quad (3)$$

$$\frac{27}{2} \quad (2)$$

$$\frac{-27}{2} \quad (1)$$

با شروع از داخلی ترین پرانتزها، توان های منفی را به توان مثبت تبدیل می کنیم:

$$[(\frac{1}{5} + \frac{1}{3})^{-1} \div (\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4})]^{-1} = [(\frac{3+5}{15})^{-1} \div (\frac{4-9}{36})]^{-1} = [\frac{15}{8} \times \frac{36}{-5}]^{-1} = [\frac{-27}{2}]^{-1} = \frac{-2}{27}$$

پاسخ

توان و اعداد توان دار

اعداد توان دار به دو صورت می توانند توان داشته باشند.

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

۱ توان در توان: در صورتی که عدد توان دار a^m به توان n برسد، حاصل برابر است با:

$$(5^2)^3 = 5^6, (a^3)^{-2} = a^{-6}$$

مثلاً

۲ توان توان: در صورتی که عدد a به توان عدد توان دار m^n برسد، ابتدا باید حاصل m^n را حساب کنیم.

$$5^{2^3} = 5^8, a^{3^{-2}} = a^{\frac{1}{3^2}} = a^{\frac{1}{9}}$$

مثلاً

مثال

حاصل عبارت های زیر را به صورت عدد توان دار بنویسید.

$$2^{2^3} \quad (ت)$$

$$(2^2)^{2^3} \quad (پ)$$

$$(2^2)^3 \quad (ب)$$

$$2^{2^3} \quad (الف)$$

پاسخ

با توجه به قوانین توان اعداد توان دار داریم:

$$(2^2)^3 = 2^{2 \times 3} = 2^6 \quad (ب)$$

$$2^{2^3} = 2^8 \quad (الف)$$

$$2^{2^3} = 2^{2^2} = 2^{2^4} = 2^{16} \quad (ت)$$

$$(2^2)^{2^3} = (2^2)^8 = 2^{2 \times 8} = 2^{16} \quad (پ)$$

تجزیه پایه در اعداد توان دار

در بعضی از اعداد توان دار با تجزیه پایه می توانیم شکل ظاهری عدد را عوض کنیم مثلاً در عدد توان دار 4^3 با توجه به این که 4 را می توان به صورت 2^2 نوشت، داریم:

$$4^3 = (2^2)^3 = 2^6$$

نکته

$$(a \times b)^m = a^m \times b^m$$

برای مقادیر دلخواه a ، b و m داریم:

$$15^7 = (3 \times 5)^7 = 3^7 \times 5^7$$

$$12^3 = (4 \times 3)^3 = (2^2 \times 3)^3 = 2^6 \times 3^3$$

مثلاً

ضرب و تقسیم اعداد توان دار

کلاً دو حالت داریم که با آن ها به خوبی آشنا هستید. برای یادآوری نگاهی به آن ها می اندازیم.

تقسیم	ضرب	حالت
$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	پایه ها برابر باشند.
$a^m \div b^m = (\frac{a}{b})^m$	$a^m \times b^m = (ab)^m$	توان ها برابر باشند.

حالا که مقدمات و قوانین ضرب و تقسیم را دوره کردیم، برویم سراغ حل چند تست کار درست!

تست

عبارت $32^{-1} \times (-4)^2 \times (\frac{1}{8})^{-2} \times 64^3$ برابر کدام است؟

4^{23} (۴)

4^{22} (۳)

2^{23} (۲)

2^{22} (۱)

توان‌های منفی را به مثبت تبدیل کرده و پایه‌ها را تبدیل به ۲ می‌کنیم!

پاسخ

$$64^3 \times (\frac{1}{8})^{-2} \times (-4)^2 \times 32^{-1} = (2^6)^3 \times 8^2 \times 4^2 \times \frac{1}{32} = 2^{18} \times (2^3)^2 \times (2^2)^2 \times \frac{1}{2^5} = \frac{2^{18} \times 2^6 \times 2^4}{2^5} = \frac{2^{28}}{2^5} = 2^{23}$$

تست

نسبت $\frac{1}{16}$ عدد 32^{n-1} به نصف عدد 4^{1-n} چیست؟

2^{7n-9} (۴)

2^{12n-1} (۳)

2^{7n-8} (۲)

2^{7n-10} (۱)

$\frac{1}{16}$ عدد 32^{n-1} برابر $\frac{32^{n-1}}{16}$ و نصف عدد 4^{1-n} برابر $\frac{4^{1-n}}{2}$ است و نسبت آن‌ها برابر است با:

پاسخ

$$\frac{32^{n-1}}{\frac{4^{1-n}}{2}} = \frac{(2^5)^{n-1}}{\frac{(2^2)^{1-n}}{2}} = \frac{2^{5n-5}}{\frac{2^{2-2n}}{2}} = \frac{2^{5n-5}}{2^{1-2n}} = 2^{5n-5-(1-2n)} = 2^{7n-6}$$

جمع و تفریق اعداد توان‌دار

جمع و تفریق را با فاکتورگیری از عددهای توان‌دار یکسان، به ضرب تبدیل می‌کنیم؛ به همین راحتی!

$$7 \times 2^5 - 4 \times 2^5 + 6 \times 2^5 = 2^5 \times (7 - 4 + 6) = 2^5 \times 9$$

مثلاً

تست

ثالث عدد $5 \times 3^{16} - 3 \times 3^{14} + 7 \times 3^{15} - 4 \times 3^{16}$ کدام است؟

3^{18} (۴)

3^{17} (۳)

3^{16} (۲)

3^{15} (۱)

3×3^{14} را به صورت 3^{15} نوشته و سپس از 3^{15} فاکتور می‌گیریم.

پاسخ

$$5 \times 3^{16} - 3 \times 3^{14} + 7 \times 3^{15} - 4 \times 3^{16} = 5 \times 3^{16} - 3^{15} + 7 \times 3^{15} - 4 \times 3^{16} = 3^{15} (5 \times 3 - 1 + 7 - 4 \times 3) = 3^{15} \times 9 = 3^{15} \times 3^2 = 3^{17}$$

ثالث عبارت برابر است با:

$$\frac{3^{17}}{3} = 3^{16}$$

تست

حاصل کسر توانی $A = \frac{2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2}}{2^{x+3} - 2^x}$ کدام است؟

۱ (۴)

2^{x-9} (۳)

2^{x-2} (۲)

۲ (۱)

از صورت و مخرج 2^x را فاکتور می‌گیریم.

پاسخ

$$A = \frac{2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2}}{2^{x+3} - 2^x} = \frac{2^x (1 + 2 + 2^2)}{2^x (2^3 - 1)} = \frac{7}{7} = 1$$

نکته

اگر توان‌های طبیعی و متوالی a با هم جمع شوند، حاصل برابر است با: $a^n + a^{n+1} + a^{n+2} + \dots + a^m = \frac{a^{m+1} - a^n}{a - 1}$

$$7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + \dots + 7^{20} = \frac{7^{21} - 7^2}{7 - 1} = \frac{7^{21} - 7^2}{6}$$

مثلاً

حاصل عبارت بالا را با روش‌های دیگری نیز می‌توان حل کرد ولی روش خودمان سرعت بیشتری دارد.

توجه



تست

اگر به ۵ برابر حاصل عبارت $۶^۰ + ۶^۱ + ۶^۲ + ۶^۳ + ۶^۴ + \dots + ۶^{۵۰}$ ، یک واحد اضافه کنیم. حاصل برابر می شود با:

$$۶^{۵۱} \quad (۱) \quad ۵ \times ۶^{۵۱} + ۱ \quad (۲) \quad ۶^{۱۰۰} \quad (۳) \quad ۵ \times ۶^{۱۰۰} + ۱ \quad (۴)$$

پاسخ: روش اول: یک را به صورت $۶^۰$ در نظر می گیریم و داریم:

$$۶^۰ + ۶^۱ + ۶^۲ + ۶^۳ + ۶^۴ + \dots + ۶^{۵۰} = \frac{۶^{۵۱} - ۶^۰}{۶ - ۱} = \frac{۶^{۵۱} - ۱}{۵}$$

$$۵ \times \left(\frac{۶^{۵۱} - ۱}{۵} \right) + ۱ = ۶^{۵۱} - ۱ + ۱ = ۶^{۵۱}$$

۵ برابر حاصل به علاوه یک برابر است با:

روش دوم: عبارت داده شده را برابر A فرض می کنیم و با تشکیل $۶A$ به سراغ حاصل $۶A - A$ می رویم:

$$A = ۱ + ۶ + ۶^۲ + ۶^۳ + ۶^۴ + \dots + ۶^{۵۰} \Rightarrow ۶A = ۶ + ۶^۲ + ۶^۳ + ۶^۴ + ۶^۵ + \dots + ۶^{۵۱} \Rightarrow ۶A - A = ۶^{۵۱} - ۱$$

$$\Rightarrow ۵A = ۶^{۵۱} - ۱ \Rightarrow A = \frac{۶^{۵۱} - ۱}{۵}$$

$$۵ \times \left(\frac{۶^{۵۱} - ۱}{۵} \right) + ۱ = ۶^{۵۱} - ۱ + ۱ = ۶^{۵۱}$$

بنابراین ۵ برابر حاصل به علاوه یک برابر است با:

تست

حاصل $۱ + (۱ + ۲ + ۲^۲ + \dots + ۲^{۱۳۷۹} + ۲^{۱۳۸۰})$ برابر با کدام گزینه است؟

$$۲^{۱۳۸۷} \quad (۱) \quad ۲^{۱۳۸۹} \quad (۲) \quad ۲^{۱۳۸۰} \quad (۳) \quad ۲^{۱۳۸۱} \quad (۴)$$

پاسخ: این تست را به سه روش حل می کنیم.

$$۱ + ۲ + ۲^۲ + \dots + ۲^{۱۳۷۹} + ۲^{۱۳۸۰} = \frac{۲^{۱۳۸۱} - ۲^۰}{۲ - ۱} = ۲^{۱۳۸۱} - ۱$$

$$\Rightarrow ۲^{۱۳۸۱} - ۱ + ۱ = ۲^{۱۳۸۱}$$

روش اول: حاصل عبارت داخل پرانتز برابر است با:

پس حاصل عبارت برابر است با:

روش دوم: عبارت داده شده را برابر A در نظر می گیریم و چون $۲A - A$ برابر A است. پس:

$$A = (۲^{۱۳۸۰} + ۲^{۱۳۷۹} + \dots + ۲^۲ + ۲ + ۱) + ۱ \Rightarrow ۲A - A = ۲^{۱۳۸۱} \Rightarrow A = ۲^{۱۳۸۱}$$

$$۲A = (۲^{۱۳۸۱} + ۲^{۱۳۸۰} + \dots + ۲^۳ + ۲^۲ + ۲) + ۲$$

$$۱ + ۱ = ۲$$

$$۱ + ۱ + ۲ = ۲ + ۲ = ۲^۲$$

$$۱ + ۱ + ۲ + ۲^۲ = ۲^۲ + ۲^۲ = ۲ \times ۲^۲ = ۲^۳$$

⋮

$$۱ + ۱ + ۲ + ۲^۲ + \dots + ۲^{۱۳۷۹} = ۲^{۱۳۸۰}$$

$$۱ + ۱ + ۲ + ۲^۲ + \dots + ۲^{۱۳۷۹} + ۲^{۱۳۸۰} = ۲^{۱۳۸۰} + ۲^{۱۳۸۰} = ۲ \times ۲^{۱۳۸۰} = ۲^{۱۳۸۱}$$

روش سوم: با استفاده از راهبرد حل مسئله ساده تر داریم:

نماد علمی

از آن جا که نمایش اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و مقایسه آن ها کار سختی است از نماد علمی استفاده می کنیم. به طور کلی نماد علمی هر عدد اعشاری مثبت به صورت $a \times ۱۰^n$ است که در آن $۱ \leq a < ۱۰$ و n عددی صحیح است.

$$۳۵۷ / ۸۲ = ۳ / ۵۷۸۲ \times ۱۰^۲ \quad ۰ / ۰۰۰۷۹۱ = ۷ / ۹۱ \times ۱۰^{-۴} \quad ۲۱۵ = ۲ / ۱۵ \times ۱۰^۲$$

مثلاً

نکته

برای نوشتن یک عدد به صورت نماد علمی اگر اعشار به سمت چپ برود به تعداد رقم های جابه جاشده به توان ۱۰ اضافه و اگر اعشار به سمت راست حرکت کند به تعداد رقم های جابه جاشده از توان ۱۰ کم می کنیم.

تست

چندتا از اعداد مقابل به صورت نماد علمی نوشته شده است؟

$$۰ / ۱۳۹۹ \times ۱۰^{-۲}, ۹۰ \times ۱۰^{-۱۳۹۹}, ۳ \times ۱۰^۰, ۱ / ۴۵۶ \times ۲^{۱۰۰}$$

$$۴ \quad (۴)$$

$$۳ \quad (۳)$$

$$۲ \quad (۲)$$

$$۱ \quad (۱)$$

پاسخ: هر کدام از اعداد را بررسی می کنیم.

$$۰ / ۱۳۹۹ \times ۱۰^{-۲} \quad ۹۰ \times ۱۰^{-۱۳۹۹} \quad ۳ \times ۱۰^۰ \quad ۱ / ۴۵۶ \times ۲^{۱۰۰}$$

$$۰ / ۱۳۹۹ \times ۱۰^{-۲} \quad ۹۰ \times ۱۰^{-۱۳۹۹} \quad ۳ \times ۱۰^۰ \quad ۱ / ۴۵۶ \times ۲^{۱۰۰}$$

$$۰ / ۱۳۹۹ \times ۱۰^{-۲} \quad ۹۰ \times ۱۰^{-۱۳۹۹} \quad ۳ \times ۱۰^۰ \quad ۱ / ۴۵۶ \times ۲^{۱۰۰}$$

تست

نمایش علمی عدد $10^{(n-2)} \times 1395$ برابر است با: $(n \in \mathbb{N}, n > 3)$

$n-2$ رقم صفر

(۱) $10^{5-2n} \times 1395$ (۲) $10^{-2n} \times 1395$ (۳) 10×1395 (۴) $10^{-1} \times 1395$

پاسخ

برای این که عدد داده شده به صورت نماد علمی شود باید ممیز به اندازه $1 + n - 2$ رقم به سمت راست حرکت کند پس از توان 10 مقدار $n - 1$ را کم می کنیم.

نکته

در جمع و تفریق چند عدد که به صورت نماد علمی نوشته شده اند بهتر است ابتدا توان 10 در اعداد را یکسان کرده و سپس فاکتورگیری کنیم.

تست

حاصل عبارت $0/2 \times 10^{-4} + 0/2 \times 10^{-3} + 0/2 \times 10^{-2}$ به صورت نماد علمی کدام است؟

(۱) $0/2 \times 10^{-9}$ (۲) $2/22 \times 10^{-3}$ (۳) $22/2 \times 10^{-3}$ (۴) $2/22 \times 10^{-5}$

پاسخ

توان های 10 را در هر سه عدد یکسان کرده و سپس فاکتور می گیریم.

$$0/2 \times 10^{-4} + 0/2 \times 10^{-3} + 0/2 \times 10^{-2} = 0/2 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} + 20 \times 10^{-4} = (0/2 + 2 + 20) \times 10^{-4}$$

$$= 22/2 \times 10^{-4} = 2/22 \times 10^{-3}$$

اعداد مربع کامل

اعدادی مربع کامل یا مجذور کامل هستند که پس از تجزیه، توان های عامل های اول آن همگی زوج باشند. **مثلاً** اعداد مربع کامل 144 و 625 را در نظر بگیرید.

تست

اگر عدد $2^3 \times a \times 9^3 \times 7^4$ مجذور کامل باشد، آن گاه a برابر کدام است؟

(۱) 14 (۲) 9 (۳) 2 (۴) 6

پاسخ

برای این که عدد داده شده مجذور (مربع) کامل باشد باید توان عامل های اول آن زوج باشد؛ پس ابتدا با تجزیه پایه ها داریم:

$$2^3 \times a \times 9^3 \times 7^4 = 2^3 \times a \times (3^2)^3 \times 7^4 = 2^3 \times a \times 3^6 \times 7^4$$

در عبارت به دست آمده فقط توان 2 زوج نیست پس با توجه به گزینه ها باید $a = 2$ باشد تا توان 2 نیز زوج شود.

توجه

a می تواند سایر توان های فرد 2 نیز باشد ولی در بین گزینه ها انتخاب دیگری نداریم.

اعداد مکعب کامل

اعدادی مکعب کامل هستند که پس از تجزیه، توان های عامل های اول آن همگی مضرب 3 باشند. **مثلاً** اعداد مکعب کامل 125 و 216 را در نظر بگیرید.

تست

بین اعداد 1001 و $1 - 2^{15}$ چند عدد مکعب کامل وجود دارد؟

(۱) 23 (۲) 22 (۳) 21 (۴) 20

پاسخ

کوچک ترین عددی که مکعب آن بزرگ تر از 1001 باشد، عدد 11 است.

از طرفی چون 2^{15} را می توان به صورت $(2^5)^3$ یعنی 32^3 نوشت، پس بزرگ ترین عددی که کوچک تر از $1 - 2^{15}$ باشد 31^3 است.

می توان نتیجه گرفت که بین اعداد 1001 و $1 - 2^{15}$ مکعب کامل های $11^3, 12^3, \dots$ و 31^3 قرار دارند که تعداد آن ها برابر است با:

$$31 - 11 + 1 = 21$$

دربارهٔ اعداد مربع کامل و مکعب کامل نکات تکمیلی زیر به کارتان می‌آید.

۱ اگر پس از تجزیهٔ یک عدد به عامل‌های اول، همهٔ توان‌ها مضرب ۶ باشند، آن عدد هم مربع کامل و هم مکعب کامل است.

یکان	دهگان	مثال
۵	حتماً ۲ است.	۶۲۵
۰	حتماً صفر است.	۱۰۰

۲ یکان هیچ عدد مربع کاملی ارقام ۲، ۳، ۷ یا ۸ نیست.

۳ بین یکان و دهگان اعداد مربع کامل رابطه‌های مقابل برقرار است.

۴ حاصل ضرب هیچ دو عدد طبیعی متوالی هرگز مربع کامل نمی‌شود.

۵ اگر n عددی زوج باشد، عدد n^n مربع کامل است ولی اگر n عددی فرد باشد، فقط در صورتی که n مربع کامل باشد n^n مربع کامل می‌شود.

مثلاً

مربع کامل است: $3^{18} = (3^2)^9 = 9^9$ ، مربع کامل است: 6^6

۶ اگر عدد a مربع کامل باشد، k امین عدد مربع کامل بعد از a برابر است با:

$$(\sqrt{a} + k)^2 = a + 2k\sqrt{a} + k^2$$

$$(\sqrt{4} + 3)^2 = 4 + 2 \times 3 \times 2 + 9 = 25$$

$$4, 9, 16, 25, 36, \dots$$

مثلاً

سومین عدد مربع کامل بعد از ۴ برابر است با:

واقعاً هم همین‌طور است اعداد مربع کامل بعد از ۴ را ببینید:

مقایسهٔ اعداد توان‌دار

روش اصلی در مقایسهٔ اعداد توان‌دار این است که با تغییر در اعداد توان‌دار پایه‌ها یا توان‌ها را یکسان کرده و سپس اعداد را مقایسه کنیم. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

تست

کدام رابطه درست است؟

$$(2) \quad 3^{30} > 7^{15} > 8^5 \times 243^3 > 2^{45}$$

$$(1) \quad 3^{30} > 2^{45} > 7^{15} > 8^5 \times 243^3$$

$$(4) \quad 7^{15} > 8^5 \times 243^3 > 2^{45} > 3^{30}$$

$$(3) \quad 8^5 \times 243^3 > 7^{15} > 3^{30} > 2^{45}$$

$$8^5 \times 243^3 = (2^3)^5 \times (3^5)^3 = 2^{15} \times 3^{15} = 6^{15}$$

ابتدا $8^5 \times 243^3$ را به صورت یک عدد توان‌دار می‌نویسیم.

$$8^5 \times 243^3 = 6^{15}$$

$$3^{30} = (3^2)^{15} = 9^{15}$$

$$2^{45} = (2^3)^{15} = 8^{15}$$

$$7^{15}$$

$$\Rightarrow 6^{15} < 7^{15} < 8^{15} < 9^{15}$$

$$8^5 \times 243^3 < 7^{15} < 2^{45} < 3^{30}$$

با توجه به اعداد به دست آمده مقایسهٔ اعداد به صورت مقابل است:

ب.م.م توان‌ها ۱۵ است پس همهٔ عددها را با توان ۱۵ می‌نویسیم:

پاسخ

نکته

مقایسهٔ توان‌های طبیعی عددی مثل a را با توجه به محدودهٔ آن در جدول زیر تمیز و مرتب آورده‌ایم.

محدودهٔ a	مقایسهٔ توان‌ها	مثال
$1 < a$	$a < a^2 < a^3 < a^4 < \dots$	$2 < 2^2 < 2^3 < 2^4 < \dots$
$0 < a < 1$	$\dots < a^4 < a^3 < a^2 < a$	$\dots < (\frac{1}{3})^4 < (\frac{1}{3})^3 < (\frac{1}{3})^2 < \frac{1}{3}$
$-1 < a < 0$	$-1 < a < a^3 < a^5 < \dots < 0 < \dots < a^6 < a^4 < a^2 < 1$	$-1 < (-\frac{1}{4}) < (-\frac{1}{4})^3 < \dots < 0$ $\dots < (-\frac{1}{4})^4 < (-\frac{1}{4})^2 < 1$
$a < -1$	$\dots < a^5 < a^3 < a < 0 < a^2 < a^4 < a^6 < \dots$	$\dots < (-3)^3 < -3 < 0 < (-3)^2 < (-3)^4 < \dots$

تست

 اگر $a < 0 < b$ باشد، کدام نامساوی برقرار است؟

$$b^3 < a^3 \quad (4)$$

$$b^2 < a^2 \quad (3)$$

$$a^3 < b^3 \quad (2)$$

$$a^2 < b^2 \quad (1)$$

 با توجه به این که $a < 0 < b$ پس a عددی منفی و b عددی مثبت است. بنابراین می توان گفت $a^3 < 0 < b^3$ یا به

پاسخ

 عبارتی $a^3 < b^3$.

توجه

 در سؤالاتی مثل این سؤال می توانیم با عددگذاری به جای a و b ، گزینه ها را بررسی کنیم.

تعداد صفرها

می دانیم از ضرب یک عامل ۲ در یک عامل ۵ در جلوی حاصل، یک صفر ظاهر می شود، پس برای به دست آوردن تعداد صفرها فقط اعدادی که عامل ۲ یا ۵ دارند را تجزیه می کنیم و سپس تعداد جفت های ۲ و ۵ را می شماریم.

 مثلاً برای به دست آوردن تعداد صفرهای عدد $16^1 \times 75 \times 25^2$ ابتدا پایه ها را تجزیه می کنیم.

$$16^1 \times 75 \times 25^2 = (2^4)^1 \times 3 \times 5^2 \times (5^2)^2 = 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 5^4 = 2^4 \times 3 \times 5^{4+2} = (2 \times 5)^4 \times 3 \times 5^2$$

در تجزیه عدد داده شده، ۴ جفت ۲ و ۵ داریم، پس تعداد صفرهای آن ۴۰ تا است.

تست

 در سمت راست $16^{2n} \times 125^{3n} \times 125^{3n}$ ، $(n \in \mathbb{N})$ تا صفر وجود دارد. مقدار n کدام است؟

$$32 \quad (4)$$

$$16 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

ابتدا پایه ها را تجزیه می کنیم و توانی از ۱۰ را تشکیل می دهیم:

پاسخ

$$125^{3n} \times 16^{2n} = (5^3)^{3n} \times (2^4)^{2n} = 5^{9n} \times 2^{8n} = 5^n \times 5^{8n} \times 2^{8n} = 5^n \times (10)^{8n}$$

 چون در سمت راست عدد، ۳۲ تا صفر وجود دارد، پس 10^{8n} همان 10^{32} است و داریم:

$$8n = 32 \Rightarrow n = 4$$

نکته

 تعداد صفرهای حاصل $n!(n \in \mathbb{N})$ با تعداد عامل های ۵ در تجزیه آن برابر است.

 برای مشخص کردن تعداد عامل های ۵ در $n!$ کافی است مجموع قسمت صحیح خارج قسمت ها را در تقسیم متوالی n بر ۵ به دست آوریم.

 مثلاً تعداد عامل های ۵ در تجزیه $50!$ برابر است با:

$$\begin{array}{r} 50 \\ \hline 10 \end{array} \begin{array}{r} 5 \\ \hline 2 \end{array} \Rightarrow 10 + 2 = 12 \text{ تعداد عامل های } 5$$

تست

 در سمت راست حاصل $79!$ چند صفر ظاهر می شود؟

$$74 \quad (4)$$

$$39 \quad (3)$$

$$18 \quad (2)$$

$$15 \quad (1)$$

 تعداد عامل های ۵ را در $79!$ می شماریم و تمام!

پاسخ

$$\begin{array}{r} 79 \\ \hline 15 \end{array} \begin{array}{r} 5 \\ \hline 3 \end{array} \Rightarrow 15 + 3 = 18 \text{ تعداد عامل های } 5$$

تعداد ارقام و مجموع ارقام

 برای مشخص کردن تعداد رقم های یک عدد توان دار در صورت امکان تعداد صفرها و تعداد ارقام حاصل ضرب بقیه عامل ها را به دست می آوریم. مجموع دو عدد به دست آمده برابر با تعداد ارقام حاصل است. به طور کلی تعداد ارقام عدد $m \times 10^n$ ($m, n \in \mathbb{N}$) برابر با $m + n$ است.



مفاهیم اولیه، توان صفر و منفی، توان توان و محاسبات

(المپیاد ریاضی)

۱۰۱۲- حاصل عبارت $\frac{1^\circ + 2^\circ + 3^\circ + \dots + 10^\circ}{(1 + 2 + 3 + \dots + 10)^\circ}$ کدام است؟

- (۱) 10° (۲) 10 (۳) 1 (۴) صفر

(تیزهوشان)

۱۰۱۳- حاصل عبارت $100 \times (-1)^{100} + (-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + \dots + (-1)^1 \times 1$ برابر است با:

- (۱) -100 (۲) $+100$ (۳) -50 (۴) $+50$

۱۰۱۴- حاصل عبارت $8 - 8[-2^2 \times (-\frac{1}{4})^3 + \frac{3}{4}(-2)^4]$ کدام است؟

- (۱) -185 (۲) $-\frac{17}{8}$ (۳) $+\frac{17}{8}$ (۴) $+185$

۱۰۱۵- حاصل عبارت $\frac{4^2 \times (-3)^2 \div 24 \times (-2)^2 - 3 \times (2^2 - 3^2)}{2 \times 3^2 - 3 \times 2^2 + 8 \div 2}$ برابر است با:

- (۱) $-\frac{33}{10}$ (۲) $\frac{33}{10}$ (۳) $\frac{10}{33}$ (۴) $-\frac{10}{33}$

(المپیاد ریاضی)

۱۰۱۶- حاصل عبارت $81^{-25/2}$ برابر است با:

- (۱) 27 (۲) 3 (۳) $\frac{1}{27}$ (۴) $\frac{1}{3}$

(انرژی اتمی)

۱۰۱۷- اگر $a = -\frac{1}{4}$ باشد، حاصل عبارت $-\frac{1}{a^{-2}}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{16}$ (۲) -16 (۳) 16 (۴) $-\frac{1}{16}$

۱۰۱۸- کدام یک از تساوی‌های زیر صحیح است؟

- (۱) $(-7^2)^5 = 7^{10}$ (۲) $(-7^5)^2 = -7^{10}$ (۳) $(-7^5)^{-2} = 7^{-10}$ (۴) $(-7^2)^{-5} = 7^{-10}$

۱۰۱۹- حاصل چندتا از عبارت‌های زیر مثبت است؟

- (الف) 4^{-3} (ب) -3^{-4} (پ) $(-4)^{-3}$ (ت) $(-3)^{-4}$
- (۱) 1 (۲) 2 (۳) 3 (۴) 4

(انرژی اتمی)

۱۰۲۰- حاصل $(-3^{-2})^{3^2}$ کدام است؟

- (۱) 3^{12} (۲) -3^{12} (۳) -3^{-18} (۴) 3^{18}

۱۰۲۱- مقدار $[2 - 3(2 - 3)^{-1}]^{-1} + [(-2)^{-1}]^2$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{20}$ (۲) $\frac{9}{20}$ (۳) $\frac{1}{20}$ (۴) $-\frac{9}{20}$

(انرژی اتمی)

۱۰۲۲- اگر $A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 999 - 1000$ باشد، آن‌گاه A^A برابر است با:

- (۱) 500.500 (۲) -500.500 (۳) $\frac{-1}{-500.500}$ (۴) 500.500

۱۰۲۳- حاصل عبارت $[(\frac{1}{4})^{-1} - (\frac{3}{4})^{-2}]^{-1}$ کدام است؟

- (۱) -2 (۲) 3 (۳) $\frac{9}{14}$ (۴) $\frac{8}{7}$

۱۰۲۴- حاصل عبارت $(\frac{2^{-4} \div 3^4}{\frac{2}{4^{-2} \div 9^2}})^{-1}$ کدام است؟

- (۱) 100 (۲) $0/01$ (۳) $0/1$ (۴) 10

۱۰۲۵- حاصل عبارت $\frac{1}{9}\{2^3 - 2^3[3^2 - 3^2(2^3 - 3^2)^{-1}]^{-1}\}$ برابر است با:

- (۱) 86 (۲) 4 (۳) صفر (۴) $\frac{68}{81}$

(انرژی اتمی)

$$A = \{2^{400} + 2, 2^{400} + 4, 2^{400} + 6, \dots, 2^{401}\}$$

$$2^{400} \quad (2)$$

$$3^{99} \quad (4)$$

۱۰۲۶- مجموعه A چند عضو دارد؟

$$2^{399} \quad (1)$$

$$4^{00} \quad (3)$$

۱۰۲۷- همه توان های ۵ از 5^0 تا 5^4 را روی تخته نوشته ایم. محسن تعدادی از این عددها را انتخاب می کند و با علامت های مثبت و منفی

پشت سر هم می نویسد، سپس حاصل عبارت را حساب می کند. کدام یک از گزینه های زیر می تواند حاصل این عبارت باشد؟ (تیزهوشان)

$$5492 \quad (4)$$

$$481 \quad (3)$$

$$715 \quad (2)$$

$$330 \quad (1)$$

۱۰۲۸- اگر آرایش پرانتزها برای محاسبه عدد توان دار 2^{2^2} تغییر کند، چند مقدار متمایز دیگر می توان به دست آورد؟

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

۱۰۲۹- جمعیت یک نوع باکتری در هر ساعت، یا ۱۸ برابر می شود یا ۱۲ برابر می شود. پس از گذشت ۱۰ ساعت، جمعیت این نوع باکتری

چند برابر می تواند شده باشد؟ (تیزهوشان)

$$9 \times 6^{15} \quad (4)$$

$$16 \times 6^{13} \quad (3)$$

$$2 \times 6^{14} \quad (2)$$

$$6^{18} \quad (1)$$

۱۰۳۰- ماشین حسابی فقط این عملیات را انجام می دهد: ضرب یک عدد در ۲ یا در ۳ و رساندن یک عدد به توان دوم یا سوم. اگر با عدد

۱۵ شروع کنیم و ۵ بار عملیاتی را با این ماشین حساب انجام دهیم، کدام یک از این گزینه ها ممکن است به دست آید؟ (لانگورو ۲۰۰۷)

$$2^3 \times 3^3 \times 5^3 \quad (3)$$

$$2^8 \times 3^4 \times 5^2 \quad (2)$$

$$2^8 \times 3^5 \times 5^6 \quad (1)$$

$$2 \times 3^2 \times 5^6 \quad (5)$$

$$2^6 \times 3^6 \times 5^4 \quad (4)$$

۱۰۳۱- کاغذی مستطیل شکل را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است تا به مستطیلی

با مساحت نصف مستطیل قبل برسیم. واضح است که در هر مرحله این کار به دو روش (افقی و عمودی) امکان پذیر است. در نهایت همه تاها را باز

کرده ایم و دیده ایم در مجموع ۳۱۸ خط تایی افقی و عمودی تولید شده است. کاغذ چند بار تا شده است؟ (المپیاد ریاضی)

$$159 \quad (3)$$

$$14 \quad (2)$$

$$13 \quad (1)$$

$$318 \quad (5)$$

$$317 \quad (4)$$

ضرب و تقسیم اعداد توان دار

۱۰۳۲- نصف عدد $2^{15} - 2$ برابر است با:

$$(-2)^{-14} \quad (4)$$

$$(-2)^{14} \quad (3)$$

$$(-2)^{-16} \quad (2)$$

$$-2^{-16} \quad (1)$$

۱۰۳۳- ثلث عدد 9^{4a-2} برابر است با:

$$3^{8a-2} \quad (4)$$

$$3^{4a-5} \quad (3)$$

$$3^{2a-2} \quad (2)$$

$$3^{8a-5} \quad (1)$$

(انرژی اتمی)

۱۰۳۴- ثلث عدد $27^x \times 9^{2-x}$ کدام است؟

$$9^2 \quad (4)$$

$$27^2 \quad (3)$$

$$3^{2+x} \quad (2)$$

$$3^{2-x} \times 9^x \quad (1)$$

(انرژی اتمی)

۱۰۳۵- ربع عدد 8^{3^2} برابر کدام است؟

$$2^{28} \quad (4)$$

$$2^{27} \quad (3)$$

$$2^{26} \quad (2)$$

$$2^{25} \quad (1)$$

(انرژی اتمی)

۱۰۳۶- نصف مجذور مربع 4^{n+1} برابر کدام است؟

$$2^{2n+7} \quad (4)$$

$$2^{8n+7} \quad (3)$$

$$2^{4n+4} \quad (2)$$

$$2^{2n+2} \quad (1)$$

۱۰۳۷- حاصل عبارت $(\frac{1}{9})^n \times (\frac{2}{9})^n \times (\frac{3}{9})^n \times \dots \times (\frac{99}{99})^n$ برابر است با:

$$\frac{594}{1200} \quad (4)$$

$$(0/01)^n \quad (3)$$

$$(\frac{99}{1200})^n \quad (2)$$

$$(\frac{594}{1200})^n \quad (1)$$

۱۰۳۸- حاصل $2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times \dots \times 2^3$ برابر کدام گزینه است؟

$$2^{32} \quad (4)$$

$$4^{20} \quad (3)$$

$$16^{12} \quad (2)$$

$$2^7 \quad (1)$$

(نمونه دولتی سمنان)

۱۰۳۹- حاصل $(5^{2^3})^2 \times [(\frac{1}{5})^{-2}]^{3^2}$ برابر کدام گزینه است؟

$$5^{28} \quad (4)$$

$$5^{30} \quad (3)$$

$$5^{24} \quad (2)$$

$$5^{34} \quad (1)$$

۱۰۴۰- حاصل $(-18)^{-5} \times (-8)^2 \times (-11)^2$ کدام است؟

- ۶ (۱) ۱۸ (۲) -۱۸ (۳) -۶ (۴)

۱۰۴۱- حاصل عبارت $[7^{2^3} \times [7^{2^3}]^2 \times (7^2)^{3^2} \times (7^2)^3]^2$ کدام است؟

- 7^{100} (۱) 7^{552} (۲) 7^{400} (۳) 7^{1104} (۴)

۱۰۴۲- اگر مجموع اعداد طبیعی ۱ تا ۵۰ برابر $\frac{x}{y}$ باشد، حاصل عبارت $7^4 \times 7^6 \times 7^8 \times \dots \times 7^{98}$ برابر است با:

- 7^{x-100} (۱) 7^{x-98} (۲) 7^{x-102} (۳) 7^{x-104} (۴)

(تیزهوشان)

۱۰۴۳- حاصل عبارت $9^{42} \times 8^{42} \times 6^{12} \times 16^6$ به صورت عدد توان دار کدام است؟

- 24^{96} (۱) 36^{72} (۲) 64^{48} (۳) 72^{32} (۴)

(المپیاد آمریکا)

۱۰۴۴- مقدار $10^{0.27} \times (0.256)^{0.9} \times (256)^{0.16}$ برابر است با:

- ۴ (۱) ۱۶ (۲) ۶۴ (۳) ۲۵۶ / ۲۵ (۴)

(انرژی اتمی)

۱۰۴۵- عبارت $D = 2^n \times 6^{n+1} \times 12^{1-2n}$ برابر کدام یک از گزینه های زیر است؟

- $2^{3-2n} \times 3^{n-2}$ (۱) $2^{2-n} \times 3^{1-2n}$ (۲) $2^{3-2n} \times 3^{2-n}$ (۳) $2^{3-n} \times 3^{2n-1}$ (۴)

۱۰۴۶- صد برابر $3! \times 4! \times 5!$ به صورت عددی توان دار برابر است با:

- $(5!)^2$ (۱) $(4!)^2$ (۲) $(3!)^2$ (۳)

- $(10 \times 5!)^2$ (۴) $(3 \times 4 \times 5)^2$ (۵)

(تیزهوشان)

۱۰۴۷- اگر کسر $\frac{-20^{20}}{(-5)^{19}}$ را به صورت عدد توان دار بنویسیم، حاصل کدام گزینه است؟

- 5×10^{40} (۱) -5×10^{40} (۲) $-4^{19} \times 5$ (۳) 5×4^{20} (۴)

۱۰۴۸- حاصل $\frac{3}{2^{-3}} \div (\frac{81}{2})^2$ برابر است با:

- 3^7 (۱) $(\frac{3}{2})^7$ (۲) $(\frac{2}{3})^7$ (۳) 2^7 (۴)

(تیزهوشان)

۱۰۴۹- حاصل $\frac{2^{-2} \times (-3)^{-2} \times 5^2 \times (-2)^2}{2^2 \times 3^{-2} \times (-5)^2 \times 3^{-1}}$ برابر است با:

- $\frac{1}{3}$ (۱) $\frac{1}{9}$ (۲) $-\frac{1}{8}$ (۳) $\frac{25}{3}$ (۴)

(انرژی اتمی)

۱۰۵۰- جذر عدد $\frac{(1/2)^3 \times (14)^2 \times 2/1}{(3/5)^3 \times 0/5}$ کدام است؟

- $1/44$ (۱) $2/88$ (۲) $0/36$ (۳) $5/76$ (۴)

(تیزهوشان)

۱۰۵۱- حاصل عبارت $\frac{15^6 \times 27^5 \times 35^3}{21^3 \times 5^3}$ چند برابر 9^3 است؟

- ۱ (۱) 45^6 (۲) $(\frac{35}{9})^6$ (۳) 105^6 (۴)

۱۰۵۲- حاصل کسر $\frac{[(\frac{3}{5})^2 \div (0/2)^2] \times 3^2 \times 5^4}{25^2 \times 7^2 \times [0/9^4 \div (\frac{3}{5})^4]}$ کدام است؟

- $\frac{1}{5}$ (۱) $\frac{1}{7}$ (۲) $\frac{1}{25}$ (۳) $\frac{1}{49}$ (۴)

۱۰۵۳- حاصل عبارت $(\frac{-1}{x^2 y^3})^3 (\frac{2}{x^2 y^3})^2 (-4x)$ کدام است؟

- ۲ (۱) ۲ (۲) $2x$ (۳) $2y$ (۴)

(المپیاد ریاضی)

۱۰۵۴- حاصل $[\frac{x^2 \times (-x^2)^{-1}}{(-x)^{-x}}]^{-1}$ به ازای $x = -2$ برابر است با:

- ۴ (۱) +۴ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $-\frac{1}{4}$ (۴)

(المپیاد ریاضی)

۱۰۵۵- حاصل $\frac{a^{\frac{5}{12}} \times a^{-\frac{3}{8}}}{a^{\frac{1}{24}}}$ برابر است با: (۰۰)

(۱) $a^{\frac{1}{2}}$ (۲) $a^{-\frac{1}{2}}$ (۳) $a^{\frac{1}{3}}$ (۴) $a^{\frac{1}{6}}$

(انرژی اتمی)

۱۰۵۶- حاصل عبارت $\frac{(\frac{a}{b})^6 \div (-b)^3}{(-\frac{1}{a})^6 \times (\frac{b}{a^2})^2}$ برابر کدام است؟ (۰۰)

(۱) $\frac{b}{a^2}$ (۲) $\frac{-a^{14}}{b^{11}}$ (۳) $\frac{a^{96}}{b^{36}}$ (۴) $\frac{-b^9}{a^2}$

۱۰۵۷- حاصل عبارت $\frac{a^3 \times b^3 \times c^{-2}}{a^{-2} \times c^2 \times b^{-1}} \div \frac{a^2 \times c^{-2} \times b}{(ab)^{-1}}$ برابر کدام است؟ (۰۰)

(۱) $(\frac{ab}{c})^2$ (۲) $(\frac{c}{ab})^2$ (۳) $\frac{a^2 b^3}{c^2}$ (۴) $a^2 b^2 c^{-2}$

$a^{16} \times [(\frac{a^2 b}{a^3 b^{-4}})^{-3} \div (\frac{ab^{-1}}{a^{-3} b^2})^5]$

۱۰۵۸- حاصل عبارت مقابل، کدام است؟ (۰۰)

(۱) a^{11} (۲) $a^{11} b$ (۳) a^{21} (۴) $\frac{1}{a}$

(تیزهوشان)

۱۰۵۹- حاصل عبارت $(\frac{q^{-1} r^{-1} s^{-2}}{r^{-5} s q^{-8}})^{-1} \times (\frac{q r^{-2} s^{-3}}{q^2 r^3})^{-3}$ کدام است؟ (۰۰)

(۱) $\frac{r^{12} s^{11}}{q^4}$ (۲) $\frac{r^{11} s^{12}}{q^4}$ (۳) $\frac{q^4}{r^{12} s^{11}}$ (۴) $\frac{q^4}{r^{11} s^{12}}$

۱۰۶۰- حاصل عبارت $\frac{x^{-4} y^{-3}}{y^{-4} x^{-6}} \div \frac{(x^{-2} y^{-1})^3}{(\frac{x}{y})^4}$ برابر است با: (۰۰)

(۱) x^{10} (۲) x^{11} (۳) x^{12} (۴) x^9

جمع و تفریق اعداد توان دار

(المپیاد ریاضی)

۱۰۶۱- حاصل عبارت $7 \times 3^{15} + 2 \times 3^{15}$ کدام است؟ (۰۰)

(۱) 9^{15} (۲) 3^{17} (۳) 3^{15} (۴) 27^{15}

۱۰۶۲- نصف عدد $3 \times 5^{18} + 5^{19} + 25^9 + 125^6$ کدام است؟ (۰۰)

(۱) 5^{10} (۲) 5^{19} (۳) 25^9 (۴) 25^{10}

۱۰۶۳- حاصل جمع نصف 4^a با ربع 2^{2a+1} کدام است؟ (۰۰)

(۱) 4^a (۲) 4^{2a-1} (۳) 2^{2a-1} (۴) $2^a + 2^{2a}$

(المپیاد ریاضی آمریکا)

۱۰۶۴- حاصل عبارت $2^{-(2k+1)} - 2^{-(2k-1)} + 2^{-2k}$ برابر است با: (۰۰)

(۱) 2^{-2k} (۲) $2^{-(2k-1)}$ (۳) $-2^{-(2k+1)}$ (۴) صفر

۱۰۶۵- حاصل عبارت $\frac{7^6 \times (3^7 + 3^7 + 3^7 + 3^7 + 3^7 + 3^7 + 3^7)}{(7^7 + 7^7 + 7^7 + 7^7 + 7^7 + 7^7) \times 6^6}$ کدام است؟ (۰۰)

(۱) $\frac{1}{512}$ (۲) $\frac{1}{256}$ (۳) $\frac{1}{128}$ (۴) $\frac{1}{64}$

(انرژی اتمی)

۱۰۶۶- حاصل عبارت $\frac{1384^2 \times 2005 - 1384 \times 2005^2}{2005 \times 621}$ کدام است؟ (۰۰)

(۱) -1384 (۲) 1385 (۳) -2004 (۴) 2005

۱۰۶۷- حاصل عبارت $\frac{12^{1399} + 11 - 12^{1400}}{1 - 12^{1399}}$ کدام است؟ (۰۰)

(۱) 11 (۲) 12 (۳) -11 (۴) -12

(روبوکاپ)

۱۰۶۸- حاصل عبارت $\frac{2^{30} + 4^{15}}{3^{30} + 9^{15} + 27^{10}}$ کدام است؟

(۱) $\frac{2^{60}}{3^{90}}$ (۲) $(\frac{2}{3})^{60}$ (۳) $(\frac{2}{3})^{25}$ (۴) $(\frac{2}{3})^{31}$

(انرژی اتمی)

۱۰۶۹- حاصل کسر $\frac{2^{1394} + 2^{1392}}{2^{697} - 8^{664}}$ به ساده‌ترین صورت کدام است؟

(۱) $\frac{5}{3}$ (۲) 2^{1393} (۳) ۳ (۴) $\frac{1}{2}$

(تیزهوشان)

۱۰۷۰- حاصل عبارت $\frac{2^{4n} + 4^{2n} + 16^n}{2^{4n+3} + 2^{2n}}$ برابر است با:

(۱) $3(2^{2n})$ (۲) ۳ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $3(2^{4n})$

۱۰۷۱- حاصل عبارت $\frac{3^x + 4 \times 3^x + 3^{x+1} - 5 \times 3^{x+1} + 3^{x+2}}{3 \times 3^{x-1} \times 3^x \times 3^{2-x} + 3^{x+1}}$ به ازای $x = 1381$ کدام گزینه است؟

(۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{6}$ (۳) $(\frac{1}{2})^{1381}$ (۴) $(\frac{1}{3})^{1381}$

(تیزهوشان)

۱۰۷۲- حاصل عبارت $\frac{7^{2014} + 7^{2013} + 7^{2012} + \dots + 7^{1014}}{7^{1393} + 7^{1392} + 7^{1391} + \dots + 7^{393}}$ به صورت عدد توان‌دار برابر است با:

(۱) 7^{621} (۲) 7^{1407} (۳) $(\frac{1}{7})^{621}$ (۴) $(\frac{1}{7})^{1407}$

۱۰۷۳- حاصل عبارت $\frac{2^{-16} + 2^{-17} + 2^{-18} + \dots + 2^{-1401}}{2^{-2022} + 2^{-2021} + 2^{-2020} + \dots + 2^{-637}}$ کدام گزینه است؟

(۱) 2^{621} (۲) 2^{-630} (۳) 2^{630} (۴) 2^{2014}

۱۰۷۴- حاصل عبارت $\frac{2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{10}}{2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + \dots + 2^{-10}}$ کدام است؟

(۱) ۵۱۲ (۲) ۲۰۴۸ (۳) ۱۰۲۴ (۴) ۴۰۹۶

(المپیاد ریاضی)

۱۰۷۵- خارج قسمت تقسیم $a + a^2 + \dots + a^{100}$ بر $a^{-1} + a^{-2} + \dots + a^{-100}$ برابر است با:

(۱) a^{100} (۲) a^{101} (۳) a^{-100} (۴) a^{-101}

(انرژی اتمی)

۱۰۷۶- حاصل عبارت $A = \frac{x^{943} + x^{942} + \dots + x^{454}}{x^{-454} + x^{-455} + \dots + x^{-943}}$ به ازای $x = 3$ کدام است؟

(۱) 3^{1396} (۲) 3^{1397} (۳) $3^{1396} - 1$ (۴) $3^{1397} - 1$

۱۰۷۷- حاصل عبارت $\frac{2 \times 2 \times 2^2 \times 2^3 \times \dots \times 2^{100}}{2 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{100}}$ به صورت عدد توان‌دار برابر است با:

(۱) 2^{100} (۲) 2^{5050} (۳) 2^{4950} (۴) ۱

(تیزهوشان)

۱۰۷۸- کدام گزینه در مورد حاصل $2^{28} + 2^{28} + 2^{29} + 2^{30} + 2^{31} + \dots + 2^{49}$ درست است؟

(۱) بیشتر از یک میلیون میلیارد (۲) بیشتر از یک هزار میلیارد (۳) کمتر از یک میلیون میلیارد (۴) کمتر از یک هزار میلیارد

(انرژی اتمی)

۱۰۷۹- اگر $3^{10} + 3^{10} + 3^2 + 3^2 + \dots + 3^2 + 3^2 = A$ باشد، مقدار $A - 3^{11}$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) 3^5

۱۰۸۰- حاصل عبارت $(5^{70} + 4(5^{70} + 5^{71} + 5^{72} + \dots + 5^{89}))$ چیست؟

(۱) 5^{89} (۲) 15^{30} (۳) 5^{93} (۴) 125^{30}

(تیزهوشان)

۱۰۸۱- حاصل عبارت $2^{100} + 2^{99} - 2^{99} - 2^{98} + 2^{98} - 2^{97} + 2^{97} - 2^{96} + \dots - 2 + 2^2 - 2^3 + 2^4 - 2^5 + 2^6 - \dots$ با کدام گزینه برابر است؟

(۱) 50×2 (۲) 100×2

(۳) $2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{50}$ (۴) $2 + 2^3 + 2^5 + 2^7 + \dots + 2^{99}$

(انرژی اتمی)

۱۰۸۲- حاصل $S = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{1396}}$ برابر کدام گزینه است؟

(۱) ۱ (۲) $\frac{1}{2^{1396}}$ (۳) $\frac{2^{1395} - 1}{2^{1396}}$ (۴) $\frac{2^{1396} - 1}{2^{1396}}$

۱۰۸۳- حاصل عبارت $\sqrt{\frac{2 \times 2^2 \times 2^{2^2} \times 2^{2^3} \times 2^{2^4} \times \dots \times 2^{2^{2^0}}}{2^{2^0-1}}}$ برابر است با:

(۱) ۱ (۲) 2^{2^0} (۳) 2^{2^0-1} (۴) 2^{2^0}

نماد علمی

(تیزهوشان)

۱۰۸۴- چندتا از عددهای زیر به صورت نماد علمی نوشته شده است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(۱) $\sqrt{7} \times 10^{-20}$ (۲) $5/3 \times 10^1$ (۳) $(\frac{1}{3})^{-1} \times 10^{15}$

۱۰۸۵- نماد علمی عدد ۴۰۰۴۰۰ کدام است؟

(۱) $400/4 \times 10^3$ (۲) $40/0.4 \times 10^4$ (۳) $4/0.04 \times 10^5$ (۴) $0/40.04 \times 10^6$

۱۰۸۶- اگر عدد 0.000000028 را به شکل $m \times 10^d$ بنویسیم که $d \in \mathbb{Z}$ و $1 \leq m < 10$ باشد، در این صورت $m + d$ کدام است؟

(۱) -۱۰ (۲) $-7/8$ (۳) $-6/2$ (۴) $-11/8$

۱۰۸۷- کدام یک از اعداد زیر با $375 \times 10^{0.000000}$ معادل نیست؟

(۱) $3/75 \times 10^{-7}$ (۲) $3\frac{3}{4} \times 10^{-7}$ (۳) $\frac{3}{8} \times 10^{-7}$ (۴) 375×10^{-9}

۱۰۸۸- نمایش علمی عدد $0.0000000002018 \times 10^{n+3}$ کدام است؟

(۱) $2/0.18 \times 10^{2n+7}$ (۲) $2/0.18 \times 10^{-2n-7}$ (۳) $2/0.18 \times 10^{-7}$ (۴) $2/0.18 \times 10^{-2}$

(المپیاد ریاضی)

۱۰۸۹- نمایش علمی عدد $0.0000000002016 \times 10^{n-1}$ برابر با کدام گزینه زیر می‌باشد؟ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$)

(۱) $2/0.16 \times 10^3$ (۲) $2/0.16 \times 10^{2n-5}$ (۳) $2/0.16 \times 10^{2n-2}$ (۴) $2/0.16 \times 10^1$

(نمونه دولتی البرز، فوژستان و قزوین)

۱۰۹۰- نماد علمی $37 \times 10^{-6} - 81 \times 10^{-4}$ کدام گزینه است؟

(۱) $4/4 \times 10^{-4}$ (۲) $4/4 \times 10^{-3}$ (۳) $4/4 \times 10^{-5}$ (۴) $0/44 \times 10^{-4}$

۱۰۹۱- نماد علمی حاصل عبارت $531 \times 10^{-1396} + 0.351 \times 10^{-1395}$ برابر است با:

(۱) $5/31351 \times 10^{-1394}$ (۲) $5/31351 \times 10^{-1393}$ (۳) $5/31351 \times 10^{-1396}$ (۴) $5/31351 \times 10^{-1395}$

۱۰۹۲- نماد علمی عبارت $5/6 \times 10^{-7} \times 2/5 \times 10^{12}$ کدام گزینه است؟

(۱) $1/4 \times 10^5$ (۲) $1/4 \times 10^4$ (۳) $1/4 \times 10^{-5}$ (۴) $1/4 \times 10^6$

(نمونه دولتی زنجان)

۱۰۹۳- نماد علمی $0.008 \times 10^{0.5} \times 0.25 \times 10^{-3}$ برابر است با:

(۱) 2×10^{-2} (۲) 2×10^4 (۳) 2×10^2 (۴) $0/2 \times 10^3$

۱۰۹۴- نماد علمی عبارت $10000 \times 10^{-23} \times 0.0225 \times 10^{-9} \times 0.003 \times 10^{-9}$ کدام است؟

(۱) $6/75 \times 10^{-21}$ (۲) $6/75 \times 10^{-19}$ (۳) $6/75 \times 10^{-22}$ (۴) $6/75 \times 10^{-20}$

(نمونه دولتی سمنان)

۱۰۹۵- حاصل کسر $\frac{12/5 \times 10^{-14}}{25 \times 10^{-19}}$ با کدام گزینه برابر است؟

(۱) 5×10^{-3} (۲) 5×10^4 (۳) 5×10^6 (۴) 5×10^2

۱۰۹۶- نمایش علمی عدد $\frac{3/6 \times 10^{-4} \times 0.00028}{0.00063 \times 10^{-3}}$ کدام است؟

(۱) $0/16 \times 10^{-3}$ (۲) $1/6 \times 10^{-3}$ (۳) $1/6 \times 10^{-2}$ (۴) $4/8 \times 10^{-2}$

۱۰۹۷- اگر داشته باشیم $a = 24 \times 10^5$ و $b = 12 \times 10^{-4}$ ، نماد علمی $\frac{a^2}{2b}$ برابر است با:

(۱) 24×10^{15} (۲) $2/4 \times 10^{15}$ (۳) 24×10^{13} (۴) $2/4 \times 10^{13}$

(نمونه دولتی گلستان)

۱۰۹۸- در بین گزینه‌های زیر کوچک‌ترین عددی که به صورت نماد علمی نوشته شده، کدام است؟

(۱) $3/7 \times 10^2$ (۲) $53/5 \times 10^2$ (۳) $1/5 \times 10^2$ (۴) $0/05 \times 10^3$

فصل هفتم

عبارت‌های گویا

عبارت‌های گویا

به فصل ۷ خوش آمدید! قبل از آن که این فصل را به صورت رسمی شروع کنیم، لازم است از همین تریبون اعلام کنیم که این فصل با فصل پنجم کتاب ارتباط بسیار صمیمانه و نزدیکی دارد.

در جای جای این فصل از تجزیه عبارت‌های جبری، اتحادها و ... استفاده می‌کنیم. خلاصه کلام این که ما مطالب فصل پنجم را پیش‌نیاز این فصل می‌دانیم. والسلام!

تعریف عبارت گویا

چندجمله‌ای‌ها که از فصل پنجم معرف حضورتان هست؟ نیست؟ پس کمی خاطره‌بازی کنیم. در چندجمله‌ای جبری باید ضریب جمله‌ها، عددی حقیقی و توان متغیرها، عددی حسابی باشد.

مثلاً عبارت‌های مقابل، چندجمله‌ای نیستند.
به کسری که صورت و مخرج آن چندجمله‌ای و مخرج آن مخالف صفر باشد، عبارت گویا می‌گوییم.

مثلاً عبارت‌های مقابل گویا هستند.

ولی عبارت‌های مقابل گویا نیستند.

تست ؟

کدام یک از عبارت‌های زیر گویا نیست؟

$$\frac{x^{\frac{1}{2}} \times y^{\frac{3}{2}}}{x+y} \quad (۴)$$

$$\frac{x+y}{2xy} \quad (۳)$$

$$\frac{4x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2} \quad (۲)$$

$$\frac{3x^2y + \sqrt{2}x}{x+y} \quad (۱)$$

پاسخ

در گزینه (۴) چون توان متغیرها عددی حسابی نیست، پس عبارت داده‌شده گویا نیست.

نکته 📖

در تشخیص عبارت‌های گویا به سؤال خوب دقت کنید، زیرا گاهی بعضی از عبارت‌ها گویا نیستند، ولی سؤال گفته کدام عبارت بعد از ساده‌شدن گویا است که حُب منطقاً تا عبارت‌ها را ساده نکنیم نمی‌توانیم نظری بدهیم.

تست ؟

ساده‌شده کدام گزینه عبارت گویا نیست؟ ($x \neq y$)

$$\frac{\pi a^2 + bm}{3c} \quad (۴)$$

$$\frac{\sqrt{x^2}}{x^2 - 1} \quad (۳)$$

$$\frac{|x^4 + y^2|}{y^4 - x^2} \quad (۲)$$

$$\frac{a^3 + 3ab^2 + 3b^3}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \quad (۱)$$

پاسخ

هر کدام از گزینه‌ها را ساده و سپس اظهار نظر می‌کنیم.

$$\frac{a^3 + 3ab^2 + 3b^3}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} = \frac{a^3 + 3ab^2 + 3b^3}{x - y}$$

گزینه (۱): مخرج را با استفاده از اتحاد مزدوج ساده می‌کنیم:

پس عبارت داده‌شده گویا است.

$$\frac{|x^4 + y^4|}{y^4 - x^4} = \frac{x^4 + y^4}{y^4 - x^4}$$

گزینه (۲): با توجه به این که $x^4 + y^4$ همواره نامنفی است، پس می‌توانیم قدرمطلق را برداریم:

این عبارت هم گویاست.

$$\frac{\sqrt{x^2}}{x^2 - 1} = \frac{|x|}{x^2 - 1}$$

گزینه (۳): حاصل $\sqrt{x^2}$ برابر $|x|$ است؛ پس:

این عبارت گویا نیست.

گزینه (۴): صورت و مخرج عبارت داده‌شده چندجمله‌ای است؛ پس این عبارت گویاست.

دامنه عبارت‌های گویا

با توجه به این که عبارت‌های گویا به صورت کسر هستند، پس به ازای مقادیری که مخرج آن‌ها را صفر کند تعریف نشده هستند؛ پس دامنه یک عبارت گویا برابر با تمام مقادیر حقیقی است که مخرج را صفر نکنند.

مثلاً عبارت گویای $\frac{3}{x+1}$ به ازای $x = -1$ تعریف نشده و دامنه آن به صورت $\mathbb{R} - \{-1\}$ است.

در تعیین دامنه عبارت‌های گویا اجازه نداریم عبارت را ساده کنیم بلکه روی عبارت داده‌شده، به همان شکل که هست کار می‌کنیم.

تست

دامنه عبارت $\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 1}$ کدام است؟

(۴) $\mathbb{R} - \{-1\}$

(۳) $\mathbb{R} - \{1, -1\}$

(۲) $\mathbb{R} - \{1\}$

(۱) $\mathbb{R}$

$x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$

پاسخ

مخرج کسر نباید صفر شود؛ پس:
دامنه عبارت گویای داده‌شده برابر $\mathbb{R} - \{1, -1\}$ است.

تست

دامنه عبارت گویای $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^2 - x - 6}$ کدام است؟

(۴) $\mathbb{R} - \{-1, -2, 3\}$

(۳) $\mathbb{R} - \{-1, 2, -3\}$

(۲) $\mathbb{R} - \{1, 2, 3\}$

(۱) $\mathbb{R} - \{-1, -2, -3\}$

$x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$

$x^2 - x - 6 \neq 0 \xrightarrow{\text{اتحاد جمله مشترک}} (x - 3)(x + 2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 3, x \neq -2$

مخرج‌ها نباید صفر شوند؛ پس:

پس دامنه عبارت داده‌شده برابر $\mathbb{R} - \{-1, -2, 3\}$ است.

تست

حاصل a^b چه قدر است در صورتی که دامنه عبارت $\frac{ax+b}{x^2+ax+b}$ ، $\mathbb{R} - \{-2, 3\}$ باشد؟

(۴) -۶۴

(۳) +۱

(۲) ۶۴

(۱) -۱

پاسخ

اعداد ۲- و ۳ در دامنه عبارت داده‌شده نیستند؛ پس مخرج به ازای آن‌ها صفر می‌شود:

$x^2 + ax + b \xrightarrow{x=-2} (-2)^2 + a \times (-2) + b = 0 \Rightarrow 4 - 2a + b = 0$

$x^2 + ax + b \xrightarrow{x=3} 3^2 + a \times 3 + b = 0 \Rightarrow 9 + 3a + b = 0$

با تفریق طرفین معادله‌های به‌دست‌آمده داریم:

$4 - 2a + b - (9 + 3a + b) = 0 \Rightarrow 4 - 2a + b - 9 - 3a - b = 0 \Rightarrow -5a - 5 = 0 \Rightarrow -5a = 5 \Rightarrow a = \frac{-5}{5} = -1$

$4 - 2a + b = 0 \xrightarrow{a=-1} 4 - 2 \times (-1) + b = 0 \Rightarrow 4 + 2 + b = 0 \Rightarrow b = -6$

$a^b = (-1)^{-6} = \frac{1}{(-1)^6} = 1$

حاصل a^b برابر است با:

در تعیین دامنه عبارت‌های گویا حواستان به کسرهایی که در مخرج می‌آیند باشد، زیرا در این حالت حداقل دو مخرج داریم که نباید صفر شوند.

تست

عبارت مقابل به ازای چه مقادیری از x تعریف نشده است؟

$$\frac{2x+1}{2-\frac{1}{x}}$$

(۴) صفر

(۳) $\frac{1}{2}, 0$

(۲) $2, 0$

(۱) $\frac{1}{2}$

مخرج هیچ کدام از کسرها نباید صفر شود؛ پس باید هم $x \neq 0$ و هم $2 - \frac{1}{x} \neq 0$ باشد:

$$2 - \frac{1}{x} \neq 0 \Rightarrow 2 \neq \frac{1}{x} \Rightarrow x \neq \frac{1}{2}$$

بنابراین عبارت داده شده، به ازای $x = 0, \frac{1}{2}$ تعریف نشده است.

تست

در عبارت $\frac{5x-3}{x^2-4} \div \frac{3x-6}{2x-8}$ متغیر x چه اعدادی نمی‌تواند باشد؟

(۴) $2, -2$

(۳) $4, -2$

(۲) $2, -2, -4$

(۱) $2, -2, 4$

عبارت را به صورت تقسیم کسری می‌نویسیم و بدون ساده کردن، ریشه‌های مخرج را مشخص می‌کنیم:

$$\frac{5x-3}{x^2-4} \div \frac{3x-6}{2x-8} = \frac{5x-3}{x^2-4} \cdot \frac{2x-8}{3x-6}$$

حالا ریشه مخرج‌ها را بررسی می‌کنیم:

$$x^2-4=0 \Rightarrow x^2=4 \Rightarrow x=\pm 2, \quad 2x-8=0 \Rightarrow 2x=8 \Rightarrow x=4$$

$$\frac{3x-6}{2x-8}=0 \Rightarrow 3x-6=0 \Rightarrow 3x=6 \Rightarrow x=2$$

بنابراین x نمی‌تواند اعداد 4 و ± 2 باشد.

ساده کردن عبارت‌های گویا

حتماً یادتان هست که برای ساده کردن یک کسر، صورت و مخرج آن را بر عامل‌های مشترک صورت و مخرج تقسیم می‌کردیم. در ساده کردن عبارت‌های گویا نیز به طریق مشابه همین کار را انجام می‌دهیم. برای ساده کردن عبارت‌های گویا، ابتدا صورت و مخرج را تجزیه کرده و سپس عامل‌های مشترک آن‌ها را با هم ساده می‌کنیم.

مثلاً برای ساده کردن عبارت $\frac{x^2-4x+4}{x^2-5x+6}$ ، صورت با استفاده از اتحاد مربع دو جمله‌ای و مخرج با استفاده از اتحاد جمله مشترک تجزیه می‌شود:

$$\frac{x^2-4x+4}{x^2-5x+6} = \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x-3)} = \frac{x-2}{x-3}$$

تست

حاصل عبارت $\frac{9x^2+x-3x^2-3}{3x^2-1}$ کدام است؟

(۴) $1-x$

(۳) $3-x$

(۲) $x-1$

(۱) $x-3$

عبارت صورت را به دو شکل زیر دسته‌بندی کرده و سپس فاکتور می‌گیریم:

$$\frac{9x^2+x-3x^2-3}{3x^2-1} = \frac{(9x^2-3x^2)+(x-3)}{3x^2-1} = \frac{3x^2(3-x)-(3-x)}{3x^2-1} = \frac{(3-x)(3x^2-1)}{3x^2-1} = 3-x$$

تست

ساده شده عبارت $\frac{a^4 - 13a^2 + 36}{a^2 + 5a + 6}$ کدام است؟ (مخرج مخالف صفر است.)

(۴) $a^2 - 5a + 6$

(۳) $a^2 + 1$

(۲) $a^2 + 5a + 6$

(۱) $a^2 - 3a + 6$

$$\frac{a^4 - 13a^2 + 36}{a^2 + 5a + 6} = \frac{(a^2 - 9)(a^2 - 4)}{(a + 2)(a + 3)}$$

صورت و مخرج به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه می شوند:

$$\frac{(a - 3)(a + 3)(a - 2)(a + 2)}{(a + 2)(a + 3)} = (a - 3)(a - 2) = a^2 - 5a + 6$$

عبارات صورت به کمک اتحاد مزدوج تجزیه می شوند:

پاسخ

تست

حاصل عبارت $\left(\frac{x-y}{y-x}\right)^{\frac{ym-2n}{n-m}}$ کدام است؟ ($m \neq n, x \neq y$)

(۴) ۱

(۳) $\frac{x^2 - y^2}{m^2 - n^2}$

(۲) $\frac{x-y}{m-n}$

(۱) $\frac{x+y}{m+n}$

$x - y$ و $y - x$ قرینه هم هستند؛ پس حاصل $\frac{x-y}{y-x}$ برابر -1 است. از طرفی با فاکتورگیری در توان هم به همین

$$\left(\frac{x-y}{y-x}\right)^{\frac{ym-2n}{n-m}} = (-1)^{\frac{2(m-n)}{n-m}} = (-1)^{-2} = 1$$

پاسخ

ترتیب داریم:

جمع و تفریق عبارت‌های گویا

مانند جمع و تفریق کسرها، برای جمع و تفریق عبارت‌های گویا نیز باید مخرج مشترک بگیریم. برای این کار ابتدا مخرج‌ها را تجزیه کرده و در صورت امکان هر کدام از کسرها را ساده می‌کنیم، سپس ک.م.م مخرج‌ها را با ضرب عامل‌های مشترک مخرج‌ها با بیشترین توان و عامل‌های غیرمشترک مخرج‌ها به دست می‌آوریم. در ادامه بعد از هم‌مخرج کردن کسرها، صورت‌ها را با هم جمع یا تفریق می‌کنیم.

مثلاً در محاسبه تفریق $\frac{x}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2}$ با توجه به این که تجزیه شده مخرج کسر اول برابر $(x - 2)(x + 2)$ است، پس ک.م.م مخرج‌ها برابر همان $x^2 - 4$ است و داریم:

$$\frac{x}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} = \frac{x}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{1}{x - 2} = \frac{x - (x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - x - 2}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{-2}{x^2 - 4}$$

تست

حاصل عبارت $\frac{x-2y}{xy} + \frac{2y+a}{ay} - \frac{3x-2a}{ax}$ کدام است؟

(۴) $\frac{a}{xy}$

(۳) $\frac{2}{x}$

(۲) $\frac{2}{y}$

(۱) صفر

مخرج مشترک سه کسر داده شده axy است؛ پس:

$$\frac{x-2y}{xy} + \frac{2y+a}{ay} - \frac{3x-2a}{ax} = \frac{a(x-2y) + x(2y+a) - y(3x-2a)}{axy} = \frac{ax-2ay+2xy+ax-3xy+2ay}{axy} = \frac{2ax}{axy} = \frac{2}{y}$$

پاسخ

تست

حاصل عبارت $\frac{(a-b)^2}{a^2-b^2} + \frac{b^2-a^2}{(a+b)^2}$ به ازای $a = 1381$ و $b = 1382$ کدام است؟

(۴) ۱۳۸۲

(۳) ۱۳۸۱

(۲) ۱

(۱) صفر

ابتدا عبارت را تا حد امکان ساده می‌کنیم. مخرج کسر اول و صورت کسر دوم را با استفاده از اتحاد مزدوج تجزیه می‌کنیم:

$$\frac{(a-b)^2}{a^2-b^2} + \frac{b^2-a^2}{(a+b)^2} = \frac{(a-b)^2}{(a-b)(a+b)} + \frac{(b-a)(b+a)}{(a+b)^2} = \frac{a-b}{a+b} + \frac{b-a}{a+b} = \frac{a-b+b-a}{a+b} = \frac{0}{a+b} = 0$$

حاصل عبارت داده شده همواره (به شرط $a \neq \pm b$) برابر صفر است.

پاسخ





مفاهیم اولیه

۲۱۴۱- کدام یک از گزینه‌های زیر، یک عبارت گویا است؟

(۴) $\frac{\sqrt{x+y}}{1+\sqrt{2}}$

(۳) $\frac{y+4}{\sqrt{x^4}+\sqrt{2}}$

(۲) $\frac{x^2+y^2+2}{2\sqrt{x+y}}$

(۱) $\frac{2x^2+3}{\sqrt{x}}$

۲۱۴۲- کدام یک از عبارت‌های زیر، گویاست؟

(۴) $\frac{\sqrt{2x^3}+1}{\sqrt{3x+x^2}}$

(۳) $\frac{x^2+x-2}{\sqrt{x+2}}$

(۲) $\frac{y^2+x^2+2x+5}{\sqrt{x^2+1}}$

(۱) $2\sqrt{x}$

۲۱۴۳- چندتا از عبارت‌های زیر عبارت گویا هستند؟ ($a \neq -x, a \in \mathbb{R}$)

$\frac{x+3y}{x+2}, \frac{5ax}{2\sqrt{a+x}}, \frac{2a+\sqrt{2}}{3}, \frac{-\sqrt{2}}{5}, 1-x+x^2, (3+\sqrt{y})(3-\sqrt{y}), 2-a-x^{-1}$

(۴) تا ۲

(۳) تا ۳

(۲) تا ۴

(۱) تا ۵

۲۱۴۴- چندتا از عبارت‌های زیر گویا هستند؟

$\frac{1}{\sqrt[3]{x}}, \frac{|x|+|y|}{x}, -\frac{2}{3}, \sqrt{x^6}, |x-y|, |x-x|, \frac{3x+\sqrt{y}}{x^2}, \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}$

(۴) ۲

(۳) ۳

(۲) ۴

(۱) ۵

دامنه عبارت‌های گویا

(نمونه دولتی اصفهان و کوگیلویه و بویراحمد)

۲۱۴۵- عبارت $\frac{3}{((2x-1)^2)^3+4}$ به ازای کدام عدد تعریف نشده است؟

(۲) $-\frac{2}{3}$

(۱) -۱

(۳) $\frac{1}{2}$

(۴) به ازای همه مقادیر، تعریف شده است.

۲۱۴۶- دامنه تعریف عبارت $P = \frac{3x^2}{x(\delta^x-1)}$ چند عدد حقیقی را شامل نمی‌شود؟

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۱

(۱) ۲

(نمونه دولتی قم)

۲۱۴۷- عبارت $\frac{x(x-1)}{x^2-4x}$ به ازای چه مقادیری از x تعریف نشده است؟

(۴) ۲، صفر و -۳

(۳) -۲، ۲ و صفر

(۲) -۲ و صفر

(۱) -۲ و ۲

(نمونه دولتی قم)

۲۱۴۸- به ازای چند مقدار طبیعی n ، حاصل $\frac{\sqrt{5-n}}{n^2-3n+2}$ عدد حقیقی است؟

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

(نمونه دولتی زنجان)

۲۱۴۹- به ازای چه مقادیری از x عبارت $A = \frac{x}{x} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x^2-5x+6}$ تعریف نشده است؟

(۴) $\{0, -2, -3\}$

(۳) $\{1, 2, 3\}$

(۲) $\{0, 2, 3\}$

(۱) $\{2, 3\}$

(نمونه دولتی گلستان)

۲۱۵۰- عبارت‌های زیر به ازای چه مقادیری از x تعریف نشده است؟

$A = \frac{x+2}{x^2+5x+6} \times \frac{(x-1)^2}{(x^2-9x)(x^2+1)}$

(۲) -۳، ۳، ۰، -۲

(۱) ۳، ۱، -۳، ۰، -۲

(۴) -۲، -۱، ۱، ۳، -۳

(۳) -۳، ۳، ۰

۲۱۵۱- عبارت C به ازای چه مقادیری از x تعریف نشده است؟

$C = \frac{x-1}{5x^2+2\sqrt{5x}+1} \div \frac{x^3-5x}{1-\sqrt{5x}}$

(۲) $\pm \frac{\sqrt{5}}{5}$

(۱) $0, \pm \sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}$

(۴) $\pm \frac{\sqrt{5}}{5}, 0, 1$

(۳) $0, \pm \sqrt{5}, \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$

۲۱۵۲- دامنهٔ تعریف کدام عبارت زیر همهٔ اعداد حقیقی است؟

(۱) $\frac{x^2(x-1)}{x}$ (۲) $\frac{x+2}{x^2+4x+4}$ (۳) $\frac{3}{x^2-2}$ (۴) $\frac{2x-3}{x^6+1}$

۲۱۵۳- اگر a و b دو عدد حقیقی غیر صفر و عبارت $\frac{x+5}{ax^2+b}$ به ازای همهٔ مقادیر x تعریف شده باشد، کدام گزینه همواره در مورد a و b درست است؟

(۱) $ab < 0$ (۲) $a+b > 0$ (۳) $\frac{a}{b} > 0$ (۴) $a-b < 0$

۲۱۵۴- عبارت $\frac{1}{x^2-ax+1}$ به ازای $x = -1$ تعریف نشده است. مقدار a کدام است؟

(۱) ۲ (۲) صفر (۳) -۲ (۴) ۳

۲۱۵۵- اگر عبارت گویای $\frac{4x+3}{x^2+ax+b}$ به ازای مقادیر $x = 1$ و $x = -3$ تعریف نشده باشد، حاصل $a-b$ کدام گزینه است؟

(۱) ۱ (۲) ۵ (۳) -۵ (۴) -۱

۲۱۵۶- اگر عبارت جبری $\frac{x+5}{x^2+mx+n}$ به ازای $\mathbb{R} - \{-3\}$ تعریف شده باشد، حاصل $n-m$ کدام است؟

(۱) ۷ (۲) ۳ (۳) -۷ (۴) -۳

ساده کردن عبارت‌های گویا

۲۱۵۷- ساده شدهٔ عبارت $\frac{3a^{12}-6a^{30}}{2a^9-4a^{25}}$ کدام است؟ ($a \neq 0$)

(۱) $\frac{3}{2}a^5$ (۲) $\frac{2}{3}a^4$ (۳) $-\frac{3}{2}a^9$ (۴) $-\frac{2}{3}a^6$

۲۱۵۸- عبارت $\frac{1-y+y^3-y^5}{1-y}$ با کدام عبارت زیر هم‌ارز است؟ ($y \neq 1$)

(۱) y^3 (۲) y^3+1 (۳) $1-y+y^3$ (۴) y^3-y^5

۲۱۵۹- ساده شدهٔ کسر $\frac{x^2-4x+kx-4k}{x^2-kx-4x+4k}$ کدام است؟

(۱) $\frac{x+3}{x-3}$ (۲) $\frac{x-k}{x+k}$ (۳) $\frac{x+k}{x-k}$ (۴) $\frac{x-4}{x+4}$

۲۱۶۰- ساده شدهٔ عبارت $\frac{x^2-2xy+y^2-x+y}{x^2-xy-x}$ برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $\frac{x-y}{x}$ (۲) $\frac{y-x}{x}$ (۳) $-y$ (۴) y

۲۱۶۱- حاصل کسر $\frac{2x^2-8x+8}{2x-4}$ کدام است؟

(۱) $2x+4$ (۲) $x+2$ (۳) $x-2$ (۴) $2x-4$

۲۱۶۲- کدام یک از عبارت‌های گویای زیر را می‌توان ساده کرد؟ (مخرج‌ها مخالف صفرند.)

(۱) $\frac{x+y}{x-y}$ (۲) $\frac{x^2+y^2}{x-y}$ (۳) $\frac{x^2-y^2}{x+y}$ (۴) $\frac{x^2+y^2}{x+y}$

۲۱۶۳- حاصل کدام گزینه، با بقیهٔ گزینه‌ها متفاوت است؟ (مخرج همهٔ کسرها، مخالف صفر است.)

(۱) $\frac{a-3}{a+3}$ (۲) $\frac{a^2-2a+1}{2a-a^2-1}$ (۳) $\frac{a^2-9}{(3-a)(3+a)}$ (۴) $\frac{2a-3b-6a}{4a+3b}$

۲۱۶۴- حاصل کسر $\frac{-12-8x+4x^2}{-2x+6}$ کدام است؟ ($x \neq 3$)

(۱) $2x+1$ (۲) $2x+2$ (۳) $-2x-2$ (۴) $\frac{x+1}{2}$

۲۱۶۵- ساده شدهٔ عبارت $\frac{c^2-a^2-b^2-2ab}{a+b-c}$ کدام است؟ (مخرج مخالف صفر است.)

(۱) $c-a-b$ (۲) $a+b-c$ (۳) $-a-b-c$ (۴) $c-a+b$

۲۱۶۶- حاصل عبارت $\frac{(x-3)(x^2-4)}{6+x-x^2}$ کدام است؟ (۲) $x \neq 3, -2$

(۱) $2-x$ (۲) $x+2$ (۳) $x-3$ (۴) $3-x$

۲۱۶۷- کدام عبارت زیر را در $\frac{x^2-2x-3}{x^2-9}$ ضرب کنیم تا حاصل برابر ۱- شود؟

(۱) $\frac{-x+3}{x-1}$ (۲) $\frac{-x-2}{x+1}$ (۳) $\frac{x-3}{x+1}$ (۴) $\frac{x-3}{x-1}$

(انرژی اتمی)

۲۱۶۸- کسر $\frac{a^{-4}-b^{-4}}{a^{-2}-b^{-2}}$ برابر کدام است؟

(۱) $a^{-6}-b^{-6}$ (۲) $a^{-2}+b^{-2}$ (۳) a^2+b^2 (۴) $a^{-2}-b^{-2}$

۲۱۶۹- ساده ترین حالت کسر $\frac{ab(a^{-2}+b^{-2}+2a^{-1}b^{-1})}{a+b}$ برابر است با: $(a, b \neq 0, a \neq -b)$

(۱) $\frac{(a+b)^2}{ab}$ (۲) $\frac{a^2b^2}{(a+b)^2}$ (۳) $\frac{ab}{a+b}$ (۴) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

۲۱۷۰- حاصل عبارت $(a^{-2}b^{-2}-2a^{-1}b^{-1}+2) \div (a^{-1}b^{-1}-2)$ کدام است؟ $(ab \neq \frac{1}{2}, a, b \neq 0)$

(۱) $\frac{1-ab}{ab}$ (۲) ab (۳) $a^{-1}b^{-1}+1$ (۴) $\frac{ab-1}{ab}$

۲۱۷۱- حاصل $\frac{(x+1)^3-2(x+1)^2+3(x+1)-1}{(x+1)^2-2(x+1)+1}$ کدام است؟ $(x \neq 0)$

(۱) $x+1$ (۲) $x+2$ (۳) x (۴) $x-1$

(المپیاد بلژیک)

۲۱۷۲- حاصل $\frac{1+x^3}{1+2x+2x^2+x^3}$ کدام است؟ $(x \neq -1)$

(۱) $\frac{1}{2x(1+x)}$ (۲) $\frac{1-x+x^2}{1+x+x^2}$ (۳) $\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ (۴) $\frac{1+x}{1+x+x^2}$

۲۱۷۳- ساده شده عبارت $\frac{x^4+x^2y^2+y^4}{x^4+x^2y^2+y^4}$ برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $x^4-y^4+x^2y^2$ (۲) $x^4+y^4+x^2y^2$ (۳) $x^4+y^4-x^2y^2$ (۴) $y^4-x^4+x^2y^2$

۲۱۷۴- ساده شده عبارت $\frac{(2x^2-3x-2)(2x^2-3x-5)+2}{(2x^2-3x-5)(2x^2-3x-1)+4}$ کدام است؟ (مخرج مخالف صفر است.)

(۱) $\frac{2x^2-3x-4}{2x^2-3x-3}$ (۲) $\frac{2x^2-3x+4}{2x^2-2x+3}$ (۳) $\frac{2x^2-3x+4}{x^2-x-3}$ (۴) $\frac{2x^2-3x+4}{2x^2-3x-3}$

۲۱۷۵- حاصل عبارت $\frac{x^2+xy}{\delta x+\delta y+xz+yz} \times \frac{10+2z}{6x}$ کدام است؟

(۱) $\frac{z+\delta}{x}$ (۲) $\frac{x}{2}$ (۳) $\frac{1}{2z}$ (۴) $\frac{1}{3}$

۲۱۷۶- ساده شده عبارت $\frac{(a^3+a-1)(a^3+a+2)-4}{(a^3+a-2)(a^3+a+2)-5}$ کدام است؟ (همه عبارات تعریف شده هستند و $a^3+a \neq -3$ است.)

(۱) $\frac{a^3+a-2}{a^3+a+3}$ (۲) $\frac{a^3+a-5}{a^3+a-7}$ (۳) $\frac{a^3+a-2}{a^3+a-3}$ (۴) $\frac{a^3+a+2}{a^3+a-3}$

جمع و تفریق عبارت های گویا

(تیزهوشان)

۲۱۷۷- $\frac{x}{x-y} - \frac{y}{y-x}$ برابر است با: $(x \neq y)$

(۱) $x-y$ (۲) $(x-y)(x+y)$ (۳) $x+y$ (۴) $\frac{x+y}{x-y}$

(انرژی اتمی)

۲۱۷۸- اگر x و y معکوس یکدیگر باشند، حاصل عبارت $\frac{3-5x}{yx} - \frac{9+3y}{y}$ معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) -۲

۲۱۷۹- ساده شده عبارت $K = \frac{a^2 - b^2}{ab} - \frac{ab - b^2}{ab - a^2}$ در کدام گزینه آمده است؟

(۱) $a - 2b$ (۲) $-\frac{a}{b}$ (۳) $\frac{a}{b}$ (۴) $2ab - a$

(نمونه دولتی ایلام - مرکزی)

۲۱۸۰- اگر $\frac{Ax - 15}{x^2 - 3x} + \frac{3}{3 - x} = \frac{A}{x}$ باشد، عدد A کدام است؟

(۱) -12 (۲) -5 (۳) 5 (۴) 12

۲۱۸۱- مقدار عددی عبارت $\frac{5b}{5a - 5b} - \frac{a^2 + ab}{a^2 - b^2} + \frac{a + b}{-a - b}$ به ازای $a = 1396$ و $b = 2017$ کدام است؟

(۱) 1396 (۲) -2 (۳) -2017 (۴) صفر

۲۱۸۲- حاصل $\frac{x-3}{x^2-9} + \frac{x+7}{x^2+10x+21}$ کدام است؟

(۱) $\frac{2}{x+3}$ (۲) $\frac{1}{2}(x-3)$ (۳) $\frac{x-3}{x+3}$ (۴) $\frac{x+3}{x-7}$

(نمونه دولتی زنجان)

۲۱۸۳- مقدار عددی عبارت زیر به ازای $x = 2\sqrt{5}$ و $y = 3\sqrt{7}$ کدام گزینه است؟

(۱) 6 (۲) $6\sqrt{35}$ (۳) $\sqrt{35}$ (۴) $\frac{x^2 - xy}{x^2 - y^2} + \frac{xy}{xy + x^2} + \frac{x^2 - 3x + 2}{(x-1)(x-2)}$

۲۱۸۴- در عبارت $\frac{f}{x} + \frac{f}{x} + \frac{f}{x} + \dots$ جملات با شماره فرد $\frac{f}{x}$ و با شماره زوج $\frac{x}{f}$ می باشد. $(x \neq 0)$ مجموع ۴۰ جمله اول این عبارت همواره برابر است با:

(نمونه دولتی کردستان)

(۱) $\frac{80 + 5x^2}{x^2}$ (۲) $\frac{40 + 5x}{x}$ (۳) $\frac{80 + 5x^2}{x}$ (۴) $\frac{40 + 5x^2}{x^2}$

(انرژی اتمی)

۲۱۸۵- اگر $A = \frac{x^2 - 4}{2x + 4}$ باشد، حاصل $\frac{1}{A} + 1$ کدام است؟

(۱) $\frac{2}{x}$ (۲) $\frac{2}{x-2}$ (۳) $\frac{x}{x-2}$ (۴) $\frac{-2}{x}$

۲۱۸۶- اگر $A = \frac{2x}{1-x^2}$ و $B = \frac{2x}{1+x^2}$ ، حاصل $1 + \frac{1}{A^2}$ برابر کدام است؟ $(x \neq 0, \pm 1)$

(۱) B^2 (۲) $\frac{1}{B^2}$ (۳) $\frac{A}{B}$ (۴) $\frac{B}{A}$

۲۱۸۷- حاصل عبارت زیر، در کدام گزینه آمده است؟ (با فرض مخالف صفر بودن مخرج ها)

(۱) $\frac{4-n}{(n^2-3n+2)(n+2)}$ (۲) $\frac{4-n}{n^2-2n+4}$ (۳) $\frac{4n}{(n-1)(n+2)}$ (۴) $\frac{2-n}{n^2-3n+2} + \frac{2}{n+2} = ?$

۲۱۸۸- اگر $A = \frac{2x^2 + 4x}{x^2 - 9}$ ، $B = \frac{1}{x-3}$ و $C = \frac{2x}{x-3}$ سه عبارت گویا باشند، حاصل عبارت $A + B - C$ کدام است؟

(نمونه دولتی گیلان)

(۱) $\frac{-1}{x-3}$ (۲) $\frac{-1}{x+3}$ (۳) $\frac{x-1}{x-3}$ (۴) $\frac{-x+1}{-x+3}$

۲۱۸۹- حاصل عبارت $\frac{2x}{x^2+2x+1} + \frac{1}{x^2-1} - \frac{2}{1+x}$ برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $\frac{-x+3}{(x-1)(x+1)^2}$ (۲) $\frac{x}{(x-2)^2}$ (۳) $\frac{x+3}{(x-1)^2}$ (۴) $\frac{x+2}{(x-2)(x-1)}$

۲۱۹۰- حاصل عبارت $\frac{x^2+1}{x^2+3x+2} + \frac{x^2-x}{x^2+x^2-2x}$ کدام است؟ $(x \neq -1, 1, 0, -2)$

(۱) $\frac{x^2+2}{x+2}$ (۲) $\frac{x+2}{x^2+2}$ (۳) $\frac{x^2+1}{x+1}$ (۴) $\frac{x+1}{x^2+1}$